

Преимущество вакцинации:

1. Сохраняет жизнь.
2. Предупреждает болезни и их осложнения.
3. Прочная основа для здоровья и благополучия населения в течение всей жизни.
4. Позволяет защитить не только человека, которому сделали прививку, но и окружающих.
5. Помогает ограничить распространение устойчивости к антибиотикам.
6. Вакцины эффективны и безопасны.
7. Если прекратить вакцинацию, некоторые неизлечимые болезни могут вернуться.

Группа населения подлежащих плановой вакцинации:

1. Дети и школьники.
2. Лица, относящиеся к группам риска по роду своей профессиональной деятельности (работники сферы образования, пищеблоков и столовых, медицинские работники).

Национальный календарь профилактических прививок в России

Возраст ребенка	Профилактическая прививка
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ)
1 месяца	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
2 месяца	Третья вакцинация против вирусного гепатита В (для детей из группы риска). Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша , столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции (последняя — для детей из группы риска)
4,5 месяца	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, пневмококковой инфекции и гемофильной инфекции (последняя — для детей из группы риска)
6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В; полиомиелита и гемофильной инфекции (последняя — для детей из группы риска)
1 год	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического

	<p>паротита. Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В для детей из группы риска</p>
1 год и 3 месяца	Ревакцинация против пневмококковой инфекции
1,5 года	Первая ревакцинация против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и гемофильной инфекции (последняя — для детей из группы риска)
1 год и 8 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита
6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
6-7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка. Ревакцинация от туберкулеза
14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита, (далее каждые 10 лет ревакцинация против дифтерии и столбняка).
От 1 года до 18 лет	Вакцинация против вирусного гепатита В для ранее не привитых детей. Вакцинация и ревакцинация от краснухи для ранее не привитых и не болевших детей
С 6 месяцев и с 1 по 11 класс	Ежегодная вакцинация против гриппа, инфекций.